3367	藤本 未和	人参	ベータリッチ

施肥　　有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	ﾒｰｶｰ(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画 使用量	計画 使用時期	計画 回数	計画 化成窒素kg	実績 使用量	実績 使用時期	実績 回数	実績 化成窒素kg
貴陽8	化成肥料　苦土2%	(株)丸徳		8		8		8		元肥	60kg	11～3月	1		60kg	11/1～3/2	1	
めぐみ-100	鶏糞、おがくず	宮崎環境保全農業協同組合			20		18			元肥	100kg	11～3月	1		100kg	11/1～3/2	1	

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　6

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	15
実績使用量	4.8

*節減対象農薬

当地比　5

節減対象農薬	実績回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤	4	
殺虫剤	1	
殺菌剤	1	
その他薬剤		
合計	6	14

病虫害の防除　　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	ﾒｰｶｰ(購入先)	使用目的	計画 希釈倍率	計画 使用量	計画 使用時期	計画 回数	計画 カウント	実績 希釈倍率	実績 使用量	実績 使用時期	実績 回数	実績 カウント	使用回数上限 商品	使用回数上限 成分
殺虫	フォース粒剤	テフルトリン		ネキリムシ類		4kg	11～3月	1	1		4kg	11/10～3/2	1	1	1	1
除草	カイタック乳剤	ペディメタリン、リニュロン		除草(播種直後)	100L	400ml	11～3月	1	2	100L	400ml	11/10～3/7	1	2	1	1,2
除草	セレクト乳剤	クレトジム		イネ科雑草	1000	70ml	2～3月	1	1	1000	70ml	2/1～3/30	1	1	1	1
除草	ロロックス(水和剤)	リニュロン		一年生雑草	1000	100g	2～3月	1	1	1000	100g	2/1～3/30	1	1	1	2
殺菌	ストロビーフロアブル	クレソキシムメチル		黒葉枯病	2000	50ml	5～6月	1	1						3	3

備考：

※ストロビーフロアブルは、5月以降収穫の圃場で、必要があれば散布します。
　その際、圃場ごとに使用時期(収穫7日前まで)を守って散布していきます。

5割減・5割減で表示します。

	計画（作業、施肥、防除など）	実績（作業）	実績（施肥）	実績（防除）
1月	播種、ビニール張り	1/5～31		
2月	播種、ビニール張り	2/1～28		セレクト乳剤、ロロックス
3月	播種、パオパオ張り	3/2～7		
4月	4/1～収穫			
5月	収穫			
6月	収穫			
7月	～7/15まで収穫予定			
8月				
9月				
10月				
11月	播種、ビニール張り	11/10～12、11/15～25	貴陽8、めぐみ-100	フォース粒剤、カイタック乳剤
12月	播種、ビニール張り	12/1～15、12/16～30		

播種開始：	令和6年11月10日
終了：	令和7年3月7日
定植開始：	
終了：	
収穫開始：	令和7年4月1日
終了：	令和7年7月15日