| 3305 | 野原　最 | レンコン | シロバナ種 |
|---|---|---|---|

**施肥**　　**有機質･土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）**



＜土づくりの使用資材･肥料について＞

使用量はkg/10a

| 商品名 | 原料 | メーカー(購入先) | 全N% | 化成N% | 全P% | 化成P% | 全K% | 化成K% | 有機率(%) | 使用目的 | 計画 | | | | 実績 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 使用量 | 使用時期 | 回数 | 化成窒素kg | 使用量 | 使用時期 | 回数 | 化成窒素kg |
| 醗酵鶏糞 | 鶏糞 | 世羅ファーム | | | | | | | 100 | 土作り | 300 | 3月 | 1 | 0.0 | 300 | 2/10 | 1 | 0.0 |
| ブラッコール | 広葉樹皮、キノコ菌床残渣、ゼオライト、光合成細菌 | 岡崎産業 | | | | | | | 100 | 土作り | 75 | 3月 | 1 | 0.0 | 75 | 4/1 | 1 | 0.0 |
| バイオノ有機 | 魚肉エキス･脱脂米ぬか | 岡崎産業 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 100 | 基肥 | 300 | 3月 | 1 | 0.0 | 300 | 4/1 | 1 | 0.0 |
| キーゼライト | 天然硫酸苦土肥料 | 森六アグリ | | | | | | | 100 | 地力維持 | 30 | 3月 | 1 | 0.0 | 30 | 4/1 | 1 | 0.0 |
| エキタン有機 | 魚肉液体蛋白 | 岡崎産業 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 追肥 | 10 | 8月 | 1 | 0.0 | 10 | 8/14 | 1 | 0.0 |
| 塩田にがり | 海水 | 寺崎農園 | | | | | | | 100 | 地力維持 | 10 | 3～9月 | 5 | 0.0 | 10 | 8/14 | 1 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【慣行農法との比較】

### *化学肥料

窒素分で比較して　当地比 **不使用** 割減

| 化学肥料 | 窒素使用量 (kg/10a) |
|---|---|
| 慣行使用量 | 30.8 |
| 実績使用量 | 0 |

### *節減対象農薬

当地比 **不使用** 割減

| 節減対象農薬 | 使用回数 | 地域の慣行防除 |
|---|---|---|
| 土壌消毒剤 | | |
| 除草剤 | | |
| 殺虫剤 | | |
| 殺菌剤 | | |
| その他薬剤 | | |
| 合計 | 0 | 5 |

**病虫害の防除**　　**使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）**

使用量/10a

| 分類 | 商品名 | 原料/成分名 | メーカー(購入先) | 使用目的 | 計画 | | | | | 実績 | | | | | 使用回数上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 希釈倍率 | 使用量 | 使用時期 | 回数 | カウント | 希釈倍率 | 使用量 | 使用時期 | 回数 | カウント | 商品 | 成分 |
| 殺虫 | ボタニガードES | ボーベリア･バシアーナGHA株 | アイ･エイチ･エス | 殺虫 | 1000 | 100～300L | 5～6月 | 2 | 0 | 1000 | 20L | 5/10 | 1 | 0 | － | － |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考:

| | 計画(作業、施肥、防除など) | 実績(作業) | 実績(施肥) | 実績(防除) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 収穫 | | | |
| 2月 | 収穫、施肥 | | 醗酵鶏糞 | |
| 3月 | 収穫、施肥、植付 | 土づくり | | |
| 4月 | 施肥、植付 | 植付 4/1 | ブラッコール、バイオノ有機、キーゼライト | |
| 5月 | 防除 | | | ボタニガードES |
| 6月 | 防除、芽回し | 芽回し | | |
| 7月 | | | | |
| 8月 | 施肥 | | エキタン有機、塩田にがり | |
| 9月 | | | | |
| 10月 | 収穫 10/21～R7.3/31 | | | |
| 11月 | 収穫 | | | |
| 12月 | 収穫 | | | |

| | |
|---|---|
| 定植開始: | 令和6年4月1日 |
| 終了: | |
| 収穫開始: | 令和6年10月21日 |
| 終了: | 令和7年3月31日 |