3455	藤本　未和	ニンジン	愛紅

施肥　　有機質･土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材･肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	ﾒｰｶｰ(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画 使用量	計画 使用時期	計画 回数	計画 化成窒素kg	実績 使用量	実績 使用時期	実績 回数	実績 化成窒素kg
めぐみ100	鶏糞	宮崎環境保全農業協同組合		0						元肥	100	8～9月	1	0.0	100	8/3～9/10	1	0.0
新阿蘇有機258	複合肥料	JA阿蘇		12		15		8		元肥	60kg	8～9月	1	7.2	60kg	8/3～9/10	1	7.2
ひかり	汚泥発酵肥料	HOKO(株)	2	0	2.5		0.4			堆肥	2000kg	8～9月	1		2000kg	8/3～9/10	1	

堆肥として使用する為
畑1枚に対して１０００ｋｇ～２０００ｋｇ

【慣行農法との比較】

***化学肥料**

窒素分で比較して　当地比　5 割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	15
実績使用量	7.2

***節減対象農薬**

当地比　5 割減

節減対象農薬	実績使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤	2	
殺虫剤	3	
殺菌剤	1	
その他薬剤		
合計	6	14

病虫害の防除　　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	ﾒｰｶｰ(購入先)	使用目的	計画 希釈倍率	計画 使用量	計画 使用時期	計画 回数	計画 カウント	実績 希釈倍率	実績 使用量	実績 使用時期	実績 回数	実績 カウント	使用回数上限 商品	使用回数上限 成分
殺虫	フォース粒剤	テフルトリン		ネキリムシ類		4kg	8～9月	1	1		4kg	8/14～9/13	1	1	1	1
除草	カイタック乳剤	ペディメタリン、リニュロン		除草(播種直後)	100L	400ml	8～9月	1	2	100L	400ml	8/14～9/13	1	2	1	1,2
殺虫	ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート		線虫(播種時)		20kg	8～9月	1	1		20kg	8/14～9/13	1	1	1	1
殺虫	フェニックス顆粒水和剤	フルペンジアミド		ヨトウムシ	3000	100L	9月	1	1	3000	100L	9/1～30	1	1	2	2
殺菌	ストロビーフロアブル	クレソキシムメチル		黒葉枯病	2000	100L	9月	1	1	2000	100L	9/1～30	1	1	3	3

備考:

※ストロビーフロアブルは、5月以降収穫の圃場で、必要があれば散布します。
　その際、圃場ごとに使用時期(収穫7日前まで)を守って散布していきます。
5割減･5割減で表示します。
今作は概ね平均的ですが、9～10月の高温で生育が早まっています。
2月中に掘り上げが必要との事。

	計画(作業、施肥、防除など)	実績(作業)	実績(施肥)	実績(防除)
1月				
2月				
3月				
4月				
5月				
6月				
7月				
8月	播種	8/14,15,21,27		
9月	播種	9/3,13		
10月				
11月	11月25～収穫予定			
12月				

播種開始:	令和7年8月14日
終了:	令和7年9月13日
定植開始:	
終了:	
収穫開始:	令和7年11月25日
終了:	令和8年2月下旬