3570	百瀬　高志	ネギ	松本一本太ねぎ

施肥　有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー（購入先）	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
エコレット055	豚ぶん堆肥50%、化成肥料	朝日アグリア	10	7.9	5	5	5	5	50		60	6/20	1	4.7	60	6/20	1	4.7
エコレット055	豚ぶん堆肥50%、化成肥料	朝日アグリア	10	7.9	5	5	5	5	50		60	10/13	1	4.7	60	10/13	1	4.7

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　6　削減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	25
実績使用量	9.48

*節減対象農薬

当地比　6　削減

節減対象農薬	使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤	3	1
殺虫剤	1	11
殺菌剤	4	9
その他薬剤		
合計	8	21

病虫害の防除　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー（購入先）	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
除草	ゴーゴーサン乳剤30	ペンディメタリン		除草	200～300ml/60L				1	200～300ml	60L	5/27	1	1	1	1
除草	トレファノサイド乳剤	トレフルラリン		除草	200～300ml/100L				1	200～300ml	100L	6/25	1	1	1	2
除草	バスタ液剤	グルホシネート		除草	300～500ml/60L				1	300～600ml	60L	9/20	1	1	2	2
殺菌	シグナムWDG	ピラクロストロビン・ボスカリド		殺菌	1500	100～300L			2	1500	100L	9/15	1	2	3	3,3
殺菌	スターナ水和剤	オキソリニック酸		殺菌	2000	100～300L			1	2000	100L	9/30	1	1	3	3
殺菌	ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ		殺菌	3000	100～300L			1	3000	100L	10/15	1	1	3	5
殺虫	グレーシア乳剤	フルキサメタミド		殺虫	2000～3000	100～300L			1	2000～3000	100L	10/15	1	1	2	4

作業内容

	計画（作業、施肥、防除など）	実績（作業）	実績（施肥）	実績（防除）		
1月					耕起開始：	
2月					終了：	
3月					播種開始：	
4月					終了：	
5月	定植	5/25　定植		ゴーゴーサン乳剤30	定植開始	令和8年5月25日
6月			エコレット055	トレファノサイド乳剤	終了：	
7月					収穫開始	令和8年11月15日
8月					終了：	令和8年12月中旬
9月				バスタ液剤、シグナムWDG,スターナ水和剤	収穫開始	
10月			エコレット055	ファンタジスタ顆粒、グレーシア乳剤	終了：	
11月						
12月						

備考：

5月に定植。8月に全て抜いて手で植え直すのが、松本1本ねぎの伝統的な作り方です。20,000本を手で植え直しました。それにより、ネギにストレスがかかり太く甘くなります。

今のところ、今後散布の予定はありません。 2026/11/9